



Plantebeskyttelse | 2011



Et stærkt medlem af Agro Danmark

LAD IKKE MANGEL
PÅ MIKRONÆRINGSSTOFFER
TAGE TOPPEN AF DIT UDBYTTE!



DAN GØDNING
- Flydende højteknologi!



- DIN FLYDENDE GØDNINGSPARTNER
OGSÅ PÅ MIKRONÆRINGSSTOFFER

Nemt, enkelt og flydende!

- Høj effekt
- Let og hurtig dosering
- Blandbar med Dangødning og plantebeskyttelse



- se mere på:

www.dangodning.dk

eller sms:

"DG mobil" til 1204

- fås hvor du handler gødning!

DG - MANGAN 180

DG - BOR 150

DG - KOBBER 117

DG - NS-8-7 m. Selen 0,33%

- til foderafgrøder

| | | |
|---|---------|---|
| Wintersæd | 2 - 7 | A |
| Vårsæd | 8 - 11 | B |
| Græsmarker og frøgræs | 12 - 13 | C |
| Majs | 14 - 15 | D |
| Ferter, raps og bederoer | 16 - 19 | E |
| Kartofler | 20 - 21 | F |
| Skovbrug m.m. | 22 - 23 | G |
| Udviklingsstadier, effekttabeller og udyrkede arealer | 24 - 28 | H |

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, forår

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|--|---|--|---|------------|---|
| Ukrudt: Ikke efterårs- behandlede marker | Alm. og enårig rapgræs, rajgræs, vindaks samt bredbladet ukrudt incl. stedmoder, ærenpris og hyrdetaske | Atlantis OD + Hussar OD + Rapsodi DFF + Oxitril CM | 0,5 ltr. 40 ml 0,5 ltr. 40 ml 0,12 ltr. | 25-32 | Atlantis OD er ikke godkendt i vinterbyg og må kun anvendes med max 0,45 ltr. i vinterrug . Højeste dosering anvendes mod enårig rapgræs DFF tilsættes især ved mange stedmoder. |
| | Alm. rapgræs, vindaks, gold og blød hejre samt bredbladet ukrudt | Ally ST + Monitor + spredklæbemiddel | 0,5-0,75 tabl. 9-12,5 g 0,2 ltr. | 25-31 | Monitor er ikke godkendt i vinterbyg og vinterrug . Mod hejrearter følges der op i stadie 32-33 med 12,5 g Monitor . |
| | Rajgræs, vindaks samt bredbladet ukrudt | Hussar OD + Olie | 65-100 ml 0,5 ltr. | 25-32 | Max. 0,025 ltr. Hussar OD i vinterbyg . Højeste dosering anvendes mod rajgræs |
| Ukrudt: Efterårsbehandlede marker | Bredbladet ukrudt incl. stedmoder | Ally ST | 0,4-0,5 tabl. | 25-31 | Mod burrenerre tilsættes 10-15 g Eagle + spredklæbemiddel eller 0,3-0,4 ltr. Lodin/Starane 180 S afhængig af temperatur på sprøjetidspunktet. |
| | Bredbladet ukrudt incl. burrenerre, kamille og snerlepileurt | Starane XL | 0,6-1,0 ltr. | 20-39 | Ved temperatur under 5° C på sprøjte-tidspunktet anvendes 0,05-0,1 ltr. Primus i stedet for Starane XL. |
| | Ovenstående + Agerstedmoder og rodukrudt | Mustang forte | 0,5-1,0 ltr. | 21-32 | Bemærk: Følsomme planter: Kartofler, roer, løg og skæmplanter (14 mdr.) Bælgplanter og kurveblomstrede arter (24 mdr.) |
| | Opfølgning på rajgræs, vindaks, samt bredbladet ukrudt incl. snerlepileurt, burrenerre og kamille | Hussar OD + Olie | 40-100 ml 0,5 ltr. | 25-32 | Højeste dosering anvendes mod rajgræs, dog altid max. 0,025 L (25 ml) i vinterbyg. |
| | Ovenstående + alm. rapgræs, rævehale og hejrearter | Broadway + PG 26 N | 110-220 gram + 0,5 ltr. | 21-32 | |
| | Opfølgning på alm. og enårig rapgræs samt vindaks | Atlantis OD | 0,5 – 0,9 ltr | 25-32 | Atlantis OD er ikke godkendt i vinterbyg og må kun anvendes med Max. 0,45 ltr. i vinterrug. |
| | | | | | |
| | Opfølgning på vindaks, alm. rapgræs, samt bredbladet ukrudt | Ally ST + Monitor + spredklæbemiddel | 0,4-0,5 tabl. 5-10 g 0,2 ltr. | 25-31 | Monitor er ikke godkendt i vinterbyg og vinterrug . Bekæmpelse af hejrearter (se Monitor løsning ovenfor). |
| | Flyvehavre samt opfølgning på agerrævehale | Topik + Olie | 0,2-0,4 ltr. 0,5 ltr. | 20-29 | Topik er ikke godkendt i vinterbyg, vinterrug og triticale. |
| | Flyvehavre samt opfølgning på vindaks | Foxtrot + spredklæbemiddel | 0,8-1 ltr. 0,2 ltr. | 20-30 | Sprøjt ikke ved temperatur under 12° C. Vær opmærksom på at sidste sprøjte-frist er stadie 30 – hvede dog frem til stadie 39. |
| | Burrenerre og pileurter | Lodin/Starane 180 S | 0,6-1,0 ltr. | 20-39 | Kan anvendes når der er god vækst i ukrudtet om foråret og helt til stadie 39 (min. 12° C) |
| | Tidsel, agerpadderokke, grå bynke og Kornblomst | MCPA 750 + Express | 1,33 ltr. 1,5 tabl. | 30-39 | Temperatur på min. 12-15°C. Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha. |

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, efterår

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Ukrudt: Standard løsning | Boxer + DFF + Oxitril | 1,0-1,5 ltr. 0,05 ltr. 0,15 ltr | 1-2 uger efter såning st. 10-12 | |
| eller | Boxer + Flight Extra | 1 ltr + 1 ltr. | når kørespor er synlige | |
| Ved forekomst af Rajgræs | Boxer + DFF + Oxitril | 2-3 ltr. 0,05 ltr. 0,15 ltr. | når kørespor er synlige | Opfølges i forår med HUSSAR /Broadway |
| Ved forekomst af agerrævehale | Boxer + Lexus | 1,5 ltr. + 7 gram | Græsukrudt 1-3 blade | Opfølges i forår med 0,2-0,4 ltr. Topik Topik ikke i vinterbyg, rug og triticale |
| Enårig rapgræs, vindaks, rajgræs og bredbladet ukrudt | Boxer + Atlantis OD + DFF | 0,75 ltr. + 0,4-0,6 ltr. + 0,05 ltr. | 11-13 | Højeste dosering ved forekomst af rajgræs. Atlantis OD må ikke bruges i vinterbyg |

Vinterhvede

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| Vækstregulering | Kortstråede sorter | Trece 750 | 0,5-1 ltr. | 25-30 | Sprøjt ikke ved temperatur under 12° C. Dosering afpasses sortens stråstyrke. |
| | Langstråede sorter | Trece 750 + Moddus M | 1,0-1,5 ltr. 0,2 ltr. | 31-33 | Afgrøde i god vækst |
| Svampe (tidlig sprøjtning) | Meldug og rust | Flexity+ Rubric | 0,1-0,125 ltr. 0,15-0,2 ltr. | 30-31 | Opmærksomheden rettes tidligt i vækst-sæsonen mod modtagelige sorter. Kraftige angreb tidligt på sæsonen kan koste udbytte, hvis behandling undlades. |
| | | Ceando | 0,3-0,5 ltr. | | |
| (1. akssprøjtning) | Meldug og hvedebladplet | Zenit | 0,25 ltr. | | |
| (2. akssprøjtning) | Septoria og rust | Bell + Comet | 0,4-0,5 ltr. 0,1 ltr. | 35-37 | Dosis er baseret på 2 behandlinger. |
| | + hvedebladplet | Proline | 0,2-0,3 ltr. | | |
| Fusarium sprøjtning | Septoria og rust | Bell + Comet | 0,4-0,5 ltr. 0,1 ltr. | 55-59 | |
| | Aksfusarium | Proline | 0,3-0,4 ltr. | 59-65 | Udsprøjtes ved fuld blomstring. |
| Skadedyr | Bladlus | Nexide CS | 50 ml | 41-75 | Følg vejledende bekæmpelsestærskler og udsendte varslinger i sæsonen. |
| | Hvedegalmyg | Mavrik | 50 ml | | |

Vinterbyg

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning |
|-----------------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Vækstregulering | | Terpal | 1-1,5 ltr. | 32-37 | Sprøjt ikke ved temperatur under 10° C. Højeste dosering i seksradet sorter. |
| | | Moddus M | 0,3-0,5 ltr. | 30-39 | |
| | | | | | |
| Svampe | Meldug, bygrust, bladplet og skoldplet | Flexity + Rubric | 0,1 ltr. 0,15-0,2 ltr. | 30-37 | Opmærksomheden rettes tidligt i vækst-sæsonen mod modtagelige sorter. Kraftige angreb tidligt på sæsonen kan koste udbytte, hvis behandling undlades. |
| | | Ceando | 0,3-0,5 ltr. | | |
| | | Zenit | 0,25 ltr. | | |
| (akssprøjtning) | Bygrust, bygbladplet og skoldplet | Comet + Orius 200 EW | 0,15 ltr. 0,3 ltr. | 37-45 | Ved aktivt meldugangreb på de øverste blade eller kraftige angreb i bunden af afgrøden tilsættes 0,1-0,2 ltr. Tern. |
| | + ramularia | Comet + Proline | 0,15 ltr. 0,2 ltr. | | |
| | | Opera | 0,3-0,5 ltr. | | |
| Skadedyr | Kornbladbillens lavre og bladlus | Cyperb 100 | 0,125 ltr. | 30-47 | Skadedyr udgør sjældent et så alvorligt problem, at det udløser en bekæmpelse. |
| | Bladlus | Nexide SC | 50 ml | 30-47 | |

Triticale

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---|---------------|
| Vækstregulering | Trece 750 | 0,5-1 ltr. | 30-31 | Udsprøjtes ved temperatur på min. 12° C. Der sprøjtes på afgrøder i god vækst. | |
| | Moddus M | 0,3-0,4 ltr. | 30-37 | | |
| Svampe | Meldug | Flexity | 30-37 | Opmærksomheden rettes tidligt i vækst-sæsonen mod modtagelige sorter. Kraftige angreb tidligt på sæsonen kan koste udbytte, hvis behandling undlades. | |
| (tidlig sprøjtning) | Meldug, rust og septoria | Orius 200 EW | | | 0,3 ltr. |
| | | Rubric | | | 0,25 ltr. |
| | | Zenit | | | 0,25 ltr. |
| (akssprøjtning) | Septoria og rust | Comet + Orius 200 EW | 45-55 | Ved aktivt meldug på de øverste blade tilsættes 0,1-0,2 ltr. Tern. | |
| | | Rubric | | | 0,2-0,25 ltr. |
| Skadedyr | Trips | Cyperb 100 | 41-47 | Trips findes under bladskeden. Skadetærskel: 2-3 Trips pr. bladskede. | |

Vinterrug

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| Vækstregulering | Trece 750 | 1,0-1,5 ltr. | 30-31 | Udsprøjtes ved temperatur på min. 12° C. Der sprøjtes på afgrøder i god vækst. | |
| | Terpal | 1,0-2,0 ltr. | 32-37 | | |
| | Moddus M | 0,3-0,4 ltr. | 30-37 | | |
| Svampe | Knækkefodsyge og skoldplet | Bell | 0,75 ltr. | 31-49 | Bekæmpelse iværksættes ved over 35% angrebne planter i vækststadium 30-31. |
| | | Skoldplet og brunrust | Orius 200 EW | 0,3 ltr. | 30-37 |
| | Rubric | | 0,25 ltr. | | |
| Skadedyr | Trips | Cyperb 100 | 41-47 | Trips findes under bladskeden. Skadetærskel: 2-3 Trips pr. bladskede. | |
| | | | | | |

Mangelsygdomme i korn

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---|
| Manganmangel (lyspletsyge) | Mangan 180 | 1-2 ltr. | | Mangansulfat tilsættes 0,2 ltr. spredklæbemiddel. |
| | Mangansulfat | 3-5 kg | | |
| Svovlmangel (skeformet blad) | Pioner S | 10-15 kg | | Udsprøjtes ved konstateret mangel. |
| Kobbermangel (gulspidssyge) | Kobberoxyklorid DG Kobber | 2-3 kg 1-5 ltr. | | |
| Forebyggelse af mangelsygdomme | EPSO mikrotop | 15-25 kg | | Kan udsprøjtes alene eller i blanding med svampemidler. |

Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med og uden græsudlæg

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|--|--|---|---|--|---|
| Ukrudt | Blandet ukrudt incl. ærenspris og stedmoder | Express ST + Oxitril CM | 0,5-1 tabl. 0,2 ltr. | 12-14 | Express ST må anvendes i korn med udlæg til frøproduktion af rødsvingel, alm. og ital. rajgræs, engrapgræs og hundegræs. |
| | Blandet ukrudt incl. pileurt og burrenerre | Express ST + Lodin / Starane 180 S | 0,5-1 tabl. 0,2-0,3 ltr. | 12-14 | |
| | Blandet ukrudt incl. pileurt, stedmoder og ærenspris | Hussar OD + DFF + Oxitril CM + Spredklæbemiddel | 20 ml 40 ml 0,12 ltr. 0,2 ltr. | 12-14 | Hussar OD må ikke anvendes i havre samt i korn med udlæg. Bedst effekt på enårig rapgræs når græsset har 1-3 blade. |
| Rajgræs, vindaks, enårig rapgræs og blandet ukrudt | Hussar OD + Olie + | 30-35 ml 0,5 ltr. | 12-29 | Primera Super kan medtages mod flyvehavre. | |
| Blandet ukrudt incl. storke- og hejrenæb, gul okseøje og liden nælde | Ally ST + Oxitril CM | 0,5 tabl. 0,2 ltr. | 12-14 | Ally ST må ikke anvendes i korn med udlæg. Her udskiftes Ally S med 0,03 liter DFF. | |
| Flyvehavre, vindaks | Foxtrot + spredklæbemiddel | 0,8-1 ltr. 0,2 ltr. | 14-30 | Må ikke anvendes i havre samt i korn med udlæg til frøgræshøst dog gerne i kløver, rød- og engsvingel samt afgræsnings-/slætgræs. | |
| Blandet ukrudt incl. burrenerre, pileurt, fuglegræs, kornblomst | Starane XL | 0,5-1 ltr. | 20-39 | Kan anvendes ved temperatur helt ned til 5° C på sprøjtetidspunktet. Højest des. ved kornblomst. | |
| Tidsel, gråbynke og andet rod ukrudt | MCPA 750 | 1,33 ltr. | 30-39 | Temperatur på min. 12-15° C. Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha. | |

Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med kløver græs- og lucerneudlæg

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|----------|---|----------------------|-----------------------|------------|--|
| Ukrudt | Blandet ukrudt | IT-Bentazone + Olie | 1,5 ltr. 0,5 ltr. | 14-30 | Udsprøjtes ved temperatur på min. 15° C. Kløveren skal min. have et trekoblet blad og græsfrøet være dækket af jord. IT-Bentazone er mest skånsom mod kløver. |
| | | Basagran M75 | 1,5-2 ltr. | | |
| | Blandet ukrudt incl. hanekro, ærenspris og korsblomstrede arter | IT-Bentazone + Stomp | 1-1,25 ltr. 1 ltr. | | |
| | | Basagran M75 + Stomp | 1-1,5 ltr. 1 ltr. | | |
| Skadedyr | Bladrandbille | Cyperb 100 | 0,125 ltr. | 14-30 | Se efter tidlige angreb under frem-spiring samt efter høst af helsæd. |

Vårbyg

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|---|----------------------|
| Vækstregulering | Terpal | 0,5-1,0 ltr. | 32-37 | Dosering afpasses sortens stråstyrke. | |
| | Moddus | 0,3-0,4 ltr. | 30-37 | | |
| Svampe | Meldug | Flexity | 32-45 | Kraftige angreb tidligt på sæsonen kan koste udbytte, hvis behandling undlades. I maltbyg sorter kan kvaliteten ofte forbedres ved behandling i stadie 32. | |
| (tidlig sprøjtning) | Meldug, bygbladplet, bygrust og skoldplet | Rubric | | | 0,25 ltr. |
| | | Zenit | | | 0,25 ltr. |
| (akssprøjtning) | Meldug, bygbladplet, bygrust og skoldplet | Comet + Orius 200 EW | 45-47 | | |
| | | Comet + Rubric | | | 0,15 ltr. 0,3-0,4 |
| | | Opera | | | 0,3-0,5 ltr. |
| Skadedyr | Kornbladbillens larve og bladlus | Cyperb 100 | 31-75 | Følg vejledende skadetærskler. | |
| | Bladlus | Nexide CS | | | 50 ml |

Havre

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|-----------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| Vækstregulering | Trece 750 | 1-1,5 ltr. | 30-31 | Dosering afpasses sortens stråstyrke. | |
| | | | | | |
| Svampe | Meldug | Zenit | 10-14 | Der sprøjtes ved eksisterende angreb. | |
| | Rust | Orius | | | 0,3-0,4 ltr. |
| | Havrebladplet | Rubric | | | 0,25-0,5 ltr. |
| Skadedyr | Fritflue og bladlus | Cyperb 100 | 10-14 | Følg varslings og skadetærskler. | |

Vårhvede

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Stadie/ Zadoks | Bemærkning | |
|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|---------------|
| Vækstregulering | Trece 750 | 0,5-1,0 ltr. | 25-30 | Dosering afpasses sortens stråstyrke. | |
| Svampe | Meldug | Flexity | 29-37 | Opmærksomheden rettes tidligt i vækstsæsonen mod modtagelige sorter. | |
| (tidlig sprøjtning) | Meldug, septoria og rust | Orius 200 EW | | | 0,3 ltr. |
| | | Rubric | | | 0,25 ltr. |
| (akssprøjtning) | Septoria og rust | Proline | 39-59 | | |
| | | Rubric | | | 0,25-0,3 ltr. |
| Skadedyr | Bladlus | Nexide CS | 31-75 | Følg vejledende skadetærskler. | |
| | | Mavrik | | | 50 ml. |
| | | | | | |

Græsmarker - flereårige med/uden kløver

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|--------------------|---|--|-------------------------------|--|
| Med kløver | Blandet ukrudt | IT-Bentazone + Olie | 2 ltr. 0,5 ltr. | Udsprøjtes forår på ukrudt i god vækst ved temperatur på min. 12° C. |
| | Blandet ukrudt incl. Skræppe og ranunkel | Gratil WG / Eagle + spredeklæbemiddel | 50 g + 0,2 ltr. | Udsprøjtes forår/sommer på ukrudt i god vækst. Skånsom mod kløver, men en kortvarig vækststandsning i hvidkløver kan forekomme. |
| Uden kløver | Blandet ukrudt incl. burresnerre | Starane XL | 1,5-1,8 ltr. | |
| | Blandet ukrudt incl. Valmue og kornblomst | Primus + Sprede/klæbemiddel | 0,075-0,15 ltr.+ 0,2 ltr. | Max. 0,075 ltr. Primus frem til stadie 29. Udsprøjtes forår på ukrudt i god vækst. |
| | Blandet ukrudt incl. mælkebøtte, skræppe, brandbæger og nælde | Lodin | 1,5-2 ltr. | Udsprøjtes forår ved temperatur på min. 12° C. |
| | Blandet ukrudt incl. vejbred og agertidsel | MCPA 750 | 1,33 ltr. | Temperatur på min. 12-15° C. Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha. |
| | Eng-, vårbrandbæger, skræppe, ranunkel og røllike | Harmony SX + spredeklæbemiddel + Lodin | 1 VOP 0,2 ltr. 0,5 ltr. | Skræppe, ranunkel og røllike behandles i juli/august med 30-37,5 g (gulfarvning af græs og kløver kan forekomme). Brandbæger behandles i august/september . |

Frøgræs

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|---|--|----------------------------|------------------------|---|
| Ukrudt | Blandet ukrudt incl. kamille, burresnerre og pileurt | Primus + spredeklæbemiddel | 0,15-0,2 ltr. | Kan udsprøjtes tidligt fra temperatur på 2° C og frem til slutningen af maj. Kan udsprøjtes fra temperatur på 5° C. |
| | | Starane XL | 1,5-1,8 ltr. | |
| Ukrudt (kun efter udlæg i kornafgrøder) | Blandet ukrudt incl. rod ukrudt | Ariane FG S | 2,5-3,5 ltr. | Max. 2,5 ltr. Ariane FG S i 1. års frømark. |
| | Blandet ukrudt incl. kamille | Ariane FG S + Primus | 1,5 ltr. 0,05 ltr. | Primus sikrer effekten selv ved lave temperaturer på behandlingstidspunktet. |
| Ukrudt | Rod ukrudt | MCPA 750 | 0,7 ltr. | Temperatur på min. 12-15° C. Min. vandmængde på 200-250 ltr./ha. |
| Fremmede græsser i rødsvingel og stivbladet svingel | | Focus Ultra + Dash | 1-1,5 ltr. 0,5 ltr. | Udsprøjtes når kvikken og de grove græsser er i god vækst og min. har 3-4 blade. Vær opmærksom på regler vedr. halmanvendelse. |
| | | Fusilade Max | 1-1,5 ltr. | |
| Vækstregulering | | Trece 750 | 2-2,5 ltr. | Halmen fra behandlet frøgræs må ikke opfodres. |
| | | Moddus M | 0,4-0,8 ltr. | |
| Sygdomme | Meldug, bladplet og rust | Bell | 0,5-0,75 ltr. | Der behandles efter behov. |
| | Rust | Orius | 0,3-0,4 ltr. | |
| | | | | |



Majs uden græsudlæg

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|--|---|------------------------------|--|--|
| Bredbladet ukrudt plus storke/hejrenæb | 1. sprøjtning | Callisto + Harmony SX | 0,5 ltr. 0,5 VOP | Harmony SX – ny formulering i Vandopløselig Pose. 1 pose = 22,5 g. Hvis store og mange snerlepileurter i 2. spr. tilsættes 0,3 ltr. Lodin |
| | 2. sprøjtning | Callisto + MaisTer + MaisOil | 0,4-0,5 ltr. 50-75 g. 0,67-1 ltr. | |
| + kvik og Kulturgræsser | 1. sprøjtning | Callisto + MaisTer + MaisOil | 0,5 ltr. + 50 g. 0,67 ltr. | Hvis mange storke/hejrenæb tilsættes 0,5 VOP Harmony SX eller 0,3 ltr. IT-Bentaxone |
| | 2. sprøjtning | Callisto + MaisTer + MaisOil | 0,3-0,5 ltr. + 50-100 g + 0,67-1,25 ltr. | |
| Bredbladet ukrudt incl. ærenpris | 1. sprøjtning | Callisto | 0,75 ltr. | Ærenpris, tidlig sprøjtning. Ved forekomst af tidsler, gråbynke og spildkartofler tilsættes Callisto i alle sprøjtninger. |
| | 2. sprøjtning | Callisto + MaisTer + MaisOil | 0,5 ltr. 50-100 g. 0,67-1,25 ltr. | |
| Ukrudt evt. 3. sprøjtning | Pileurt, brandbæger, skræppe, kærgalten- tand og sort natskygge | Lodin | 0,6-1,5 ltr. | Udsprøjtes ved temperatur på min. 12° C inden majsens 7 bladstadie. Højeste dosering mod stort ukrudt og rodukudt. |
| Skadedyr | Fritflue | Cyperb 100 | 0,2 ltr. | Udsprøjtes på majsens 1½-2 bladstadie. Behandlingen gentages evt. 10-14 dage senere. |

Ærter

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning | |
|---|---|----------------------|------------------------|---|
| Ukrudt 1. sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie | Blandet ukrudt incl. stedmoder og hanekro | Basagran M75 + Stomp | 0,75 ltr. 0,75 ltr. | Bedst virkning opnås, når der sprøjtes ved en temperatur på min. 12° C på saftspændte planter i god vækst. Fenix bør indgå i løsningen på arealer med store problemer med burresnerre eller som en del af en "nødløsning", hvis ukrudtet er blevet for stort på sprøjtetidspunktet. Basagran M75 kan i varmt vejr give kraftige hormonsymptomer på afgrøden. |
| | Blandet ukrudt incl. enårig rapgræs, melde og pileurt | Fenix + IT-Bentazone | 0,5 ltr. 0,5 ltr. | |
| Ukrudt: 2. sprøjtning 8-10 dage senere på ny-fremspiret ukrudt på kimbladstadiet | Blandet ukrudt incl. stedmoder og hanekro | Basagran M75 + Stomp | 0,75 ltr. 0,75 ltr. | |
| | Blandet ukrudt incl. enårig rapgræs, melde og pileurt | Fenix + IT-Bentazone | 0,5 ltr. 0,4 ltr. | |
| Ukrudt | Kvik, flyvehavre samt andre græsser | Focus Ultra + Dash | 1,5-2 ltr. 0,5 ltr. | |
| | | Agil 100 EC | 0,75-1,5 ltr. | |
| Sygdomme | Ærtesyge og skimmel | Amistar | 0,5-1 ltr. | Behandling udføres ved begyndende blomstring. |
| Skadedyr | Bladrandbille, bladlus og ærtevikler | Nexide CS | 50 ml | Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. |
| | | Mavrik | 0,1-0,2 ltr. | |

Vinterraps, forår

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning | |
|----------------|---|------------------------|-------------------------------|--|
| Ukrudt | Kvik og flyvehavre samt andre græsser | Focus Ultra + Dash | 1,5-2 ltr. 0,5 ltr. | Højeste dosering mod kvik – alternativt kan der med fordel anvendes i splitsprøjtning (2 x ½ dosering). |
| | | Agil 100 EC | 0,7 ltr. | |
| | Kamille og tidsel | Loncid + Olie | 0,8 ltr. 0,5 ltr. | Tilsæt altid olie for at sikre effekten. Kræver 6 timers tørvej. Temp. over 10-12 gr. |
| | Kamille og burresnerre | Galera + PG26N | 0,3 ltr. + 0,3 ltr. | Vinterraps stadie 30-50. Temperatur 8-9 gr. |
| Sygdomme | Gråskimmel, knold-bægersvamp og skulpesvamp | Orius 200 EW + Amistar | 0,4-0,5 ltr. 0,35-0,4 ltr. | Udsprøjtes forebyggende ved fuld blomstring (Cantus kan anvendes allerede fra begyndende blomstring). |
| | | Cantus | 0,4-0,5 kg | |
| Skadedyr | Glimmerbøsse og skulpesnudebille | Biscaya Mavrik | 0,2-0,3 ltr. 0,225 ltr. | Biscaya anvendes én gang pr. sæson, og der følges op med Mavrik behandlinger efter behov. NEXIDE CS uden for biernes flyvetid. |
| | Galmyg | Nexide CS | 60 ml | |
| Mangelsygdomme | Svovlmangel | Pioner S | 10-15 kg | Udsprøjtes forebyggende når rapsen er 10-15 cm høj eller straks ved konstateret mangel. |
| | Bormangel | DG Bor Solubor | 1,25-2,50 kg 5-6 kg | |
| | Magnesiummangel | Bittersalt | 25 kg | |

Vinterraps, efterår

| Problem | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning | |
|-----------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Ukrudt | Bredbladet ukrudt | Command | 0,2-0,33 ltr. | Senest 2-3 dage efter såning Laveste dosis på let jord. |
| | Bredbladet ukrudt + valmue | Command + Stomp | 0,15 ltr. + 0,5 ltr. | Senest 2-3 dage efter såning |
| Spildkorn | | Agil + Spredeklæbemiddel | 0,5 ltr. + 0,2 ltr. | Spildkorn 1-2 blade |
| | | Focus ultra + Dash | 0,4-0,7 ltr. + 0,5 ltr. | Spildkorn 1-2 blade |
| Skadedyr | Raps jordlopper | Nexide Cl | 60 ml | |
| | Agersnegle | Sidste måltid | 10-12 kg | 1-3 behandlinger efter behov |

Bederoer

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|--|--|--|---|--|
| Ukrudt: 1. sprøjtning på kimbladstadiet | Bredbladet ukrudt incl. enårig rapgræs, kamille og fuglegræs | Betanal Power + Goltix + Olie | 0,4-0,5 ltr. 0,5 ltr. 0-0,5 ltr. | Det er vigtigt at behandle på ukrudtets kimbladstadie. Er man kommet for sent, justeres doseringerne op afhængig af ukrudtets størrelse på sprøjtetidspunktet. VIGTIGT: Anvend korrekt vandmængde: Ved 0,4 l Betanal Power max. 100 l vand Ved 0,5 l Betanal Power max. 125 l vand Ved 0,6 l Betanal Power max. 150 l vand |
| Ukrudt: 2. sprøjtning 5-10 dage efter 1. sprøjtning | Bredbladet ukrudt incl. burresnerre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsel | Betanal Power + Goltix + Ethosan + Safari + Olie | 0,4-0,6 ltr. 0,5 ltr. 0,07 ltr. 15 g 0-0,5 ltr. | Dosering af Olie: 0,5 ltr. Olie: Temperatur under 15° C. 0,2 ltr. Olie: Temperatur mellem 15-20° C. Ingen Olie: Temperatur over 20° C. |
| Ukrudt: Evt. 3. sprøjtning 10-14 dage efter 2. sprøjtning på ny-fremspiret ukrudt | Bredbladet ukrudt incl. burresnerre, sort natskygge, storkenæb, hundepersille, gulurt og fliget brøndsel | Betanal Power + Goltix + Ethosan + Safari + Olie | 0,4-0,6 ltr. 0,5 ltr. 0,07 ltr. 15 g 0-0,5 ltr. | En evt. 4. sprøjtning med 15-30 g Safari + 0,5 ltr. Olie kan være nødvendig 10-14 dage efter 3. sprøjtning (tilse afgrøden). |
| Ukrudt | Tidsel, gråbynke, kamille | Loncid / Matrigon | 0,25 ltr. | Udsprøjtes ved temperatur på min. 12° C på ukrudt i god vækst. Max. 30 g Safari pr. sæson |
| | Ferskenpileurt | Safari Olie | 30 g 0,5 ltr. | |
| | Kvik og flyvehavre samt andre græsser | Focus Ultra + Dash Agil 100 EC | 1,5-3 ltr. 0,5 ltr. 0,75-1,5 ltr. | |
| Svampe | Ramularia, meldug, rust | Rubric | 0,25-0,5 ltr. | Evt. splitbehandling. |
| Skadedyr | Trips og bedefluelarve | Cyperb 100 | 0,125 ltr. | Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. |
| | Bladlus | Pirimor G | 0,3 kg | |
| Mangelsygdomme | Bormangel | DG Bor Solubor | 1,25-2,5 ltr. 5-6 kg | Udsprøjtes forebyggende eller straks ved konstateret mangel. |
| | Manganmangel | Mangan 180 (flyd.) Mangansulfat | 1,5-2 ltr. 2-4 kg | |

Kartofler

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Udsædsbårne sygdomme | Rodfiltsvamp | Rizolex 10 D | | 100 g pudder pr. 100 kg kartofler. |
| | | Monceren DS 12,5 | | 200 g pudder pr. 100 kg kartofler. |
| | | Rizolex 50 FW | 0,75 ltr. | Udbringes med specialudstyr ved lægning |
| | | Monceren FS 250 | | 60 ml pr. 100 kg kartofler. |
| + skadedyr | Rodfiltsvamp, cikader, lus og coloradobille | Prestige | 1-1,2 ltr. | Tilsæt ekstra Rizolex/Monceren såfremt der anvendes mere end 2,2 tons læggemateriale pr. ha. |
| 1. sprøjtning inden kartoflernes fremspiring. Moderat ukrudtsbestand | Bredbladet ukrudt incl. korsblomstret, kamille, hanekro, vej- og snerlepileurt. | Fenix + Titus + spredklæbemiddel | 1,0 ltr. 10 g 0,2 ltr. | Hvis ukrudtet er blevet for stort inden behandling kan der tilsættes 1,25 ltr. Roundup (aldrig i læggekartofler) eller 1 – 1,25 ltr. Reglone pr. ha. Boxer udbringes i 2. sprøjtning |
| | 10-14 dage efter | Titus | 15-20 g | |
| | Ovenstående samt sort natskygge | Boxer | 2 ltr. | |
| Alternativ plan 1 uge før fremspiring (Fabrikskartofler) | Snerlepileurt, burre-Snerre, enårig rapgræs Vejpileurt | Fenix + Roundup | 1,0 ltr. + 1,25 ltr. | Titus: De 30 g kan under ugunstige sprøjteforhold deles i 2 x 15 g med ca. 7-10 dages mellemrum. Boxer udbringes ved 2. sprøjtning |
| 10 – 14 dage Efter | + sort natteskygge | Titus + Spredklæbemiddel Boxer | 20-30 g 2 ltr. | |
| Ukrudt | Kvik og flyvehavre samt andre græsser | Focus Ultra + Dash | 1,5-2 ltr. 0,5 ltr. | Højeste dosering mod kvik – alternativt kan der med fordel anvendes splitsprøjtning (2 x ½ dosering). |
| | | Agil 100 EC | 0,75-1,25 ltr. | |
| Skadedyr | Tæge, bladlus og coloradobille | Cyperb 100 | 0,2 ltr. | Følg udsendte prognoser/varslinger og tilse afgrøden løbende gennem sæsonen. Systemisk virkning med langtidseffekt. Højeste dos. ved bladlus. |
| | | Mospilan SC | 60-150 gram | |
| | Ovenstående + cikade | Karate 2,5 WG | 0,3-0,5 kg | |
| | Bladlus virusforebyggende | Teppeki | 160 gram | |
| Sygdomme | Kartoffelskimmel | Tridex | 2,0 kg | Forebyggende sprøjtning. |
| | | Rannman + additiv + Tridex | 0,1 ltr. 0,15 ltr. 1,0 kg | Max. grænse for anvendelse af Ridomil Gold og Rannman - følg etikettens anvisninger. |
| | | Ridomil Gold | 2 kg | Forebyggende sprøjtning forud for højriskoperiode. |
| | | Revus | 0,6 kg | |
| | Knoldskimmel | Rannman + Additiv | 0,2 ltr. 0,15 ltr. | Forebyggende sprøjtning ved risiko for knoldskimmel. |
| Nedvisning | | Reglone | 3-5 ltr. | Splitbehandling foretrækkes ofte. |

Skovbrug

| Problem | | Løsning | Dosis/ha | Bemærkning |
|---------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Ukrudt Juletræer | Bredbladet ukrudt og græs | Roundup Bio / Glyfonova Plus | 2-4 ltr. | Afskærmet sprøjtning i alle skovkulturer. Ikke i Nobilis |
| | Tidsel, kamille, brand-bæger, gråbynke og bakkestjerne | Loncid / Matrigon | 1,5 ltr. | Kun i etablerede gran og ædelgrankultur – må ikke anvendes i fyrtræskultur. |
| | Bredbladet ukrudt og græs, incl. kamille, brandbæger og bakkestjerne | Quarts + LOGO + olie | 0,25-ltr.+ 150 g + 2,0 ltr. | QUARTS udsprøjtet i det tidlige forår LOGO udsprøjtet omkring maj, dog senest 10 dage før knopbrydning |
| | Bredbladet ukrudt og græs, incl. kamille, brandbæger og bakkestjerne | Pistol | 3,1 ltr. | Løsningen har endvidere 50-60% effekt på agerpadderokke |
| | Bjørneklo | Roundup Bio / Glyfonova Plus Spredeklæbemiddel | | Der sprøjtes op til 3 gange (første gang primo maj med 5-7 dages mellemrum) med en 3% opløsning af Roundup Bio tilsat spredeklæbe-middel . |
| Skadedyr | Bladlus, ædelgranlus, vikler og måler, barkbiller | Cyperb 100 | 0,2 ltr. | Der sprøjtes ved konstaterede angreb. |
| | Nåletræsnudebiller | Sumi-Alpha EW | 1,5-2,5 ltr. | |

Ranman

...beskytter nytilvækst
...bedst forebyggende
...bedst mod knoldskimmel



I 2011 markedsføres Ranman i en ny og større emballage.

**5 liter Ranman +
3,75 liter Additiv**

Læs altid etiketten for brug!



Nordisk Alkali

www.nordiskalkali.dk

*Rizolex
+ Mospilan SG
= Behovsbestemt
planteværn*

Rizolex bekæmper rodfiltsvamp ved lægning.
Mospilan SG anvendes til at bekæmpe skadedyr,
hvis der er noget at komme efter.

Det er behovsbestemt planteværn.



Læs altid etiketten
for brug!



Nordisk Alkali

www.nordiskalkali.dk

Effekttabel svampe i korn – Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn

| Sygdomme | A-proach | Amistar | Acanto Prima | Bell | Ceando | Comet | Flexity | Folicur EC 250 / Ritza | Juventus 90 | Opera | Opus / Rubric / Maredo | Orius 200 EW | Pro-line 1) | Stereo | Tern | Bumper / Tilt 250 EC | Unix | Zenit |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| | (pico-xystrobin) | (azo-xystrobin) | (pico-xystrobin + cyprodinil) | (epoxiconazol + boscalid) | (epoxiconazol + metrafenon) | (pyraclostrobin) | (metrafenon) | (tebuconazol) | (metconazol) | (pyraclostrobin + epoxiconazol) | (epoxiconazol) | (tebuconazol) | (prothioconazol) | (propiconazol + fenpropidin) | (fenpropidin) | (propiconazol) | (cyprodinil) | (propiconazol + fenpropidin) |
| Knækkefodsyge | - | - | * | ** | ** | - | ** | - | - | - | - | - | ** | ** | - | - | ** | - |
| Hvedemeldug | *2) | *2) | **2) | *(*) | ****(*) | *2) | ****(*) | *** | ** | **2) | ** | *** | ** | *** | **** | ** | *** | ****(*) |
| Bygmeldug | **2) | *2) | ***(*)2) | **(*) | ****(*) | **2) | ****(*) | **** | *** | **(*)2) | *** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | **** |
| Gulrust | **(*) | ***(*) | ** | ***** | ***** | ****(*) | - | ****(*) | *** | ****(*) | ***** | ****(*) | *** | ***(*) | ** | ***(*) | * | ***(*) |
| Brunrust | ***(*) | ***(*) | *** | ****(*) | ****(*) | **** | - | ****(*) | ***(*) | ****(*) | ****(*) | ****(*) | *** | *** | *** | *** | * | ***(*) |
| Bygrust | ****(*) | ****(*) | *** | ****(*) | ****(*) | ****(*) | - | **** | **** | ****(*) | ****(*) | **** | **** | *** | *** | *** | * | ****(*) |
| Septoria | *2) | *2) | *2) | ****(*) | **** | *2) | - | **(*) | ***(*) | ***(*)2) | **** | **(*) | **** | ** | * | ** | * | ** |
| Hvedebladplet | *2) | *2) | *2) | ** | ** | *2) | - | * | * | **2) | ** | * | ***(*) | ***(*) | * | ***(*) | * | ***(*) |
| Skoldplet | *** | **(*) | **** | ***(*) | ***(*) | ***(*) | - | *** | *** | **** | ***(*) | *** | **** | **** | **(*) | *** | *** | ***(*) |
| Bygbladplet | ****(*)3) | ***3) | ****(*)3) | **** | ***(*) | ****(*)3) | - | *** | *** | ****(*)3) | ***(*) | *** | ***(*) | **** | **(*) | ***(*) | ***(*) | ***(*) |
| Ramularia | *2) | *2) | *2) | ****(*) | ***(*) | *2) | - | - | - | ***(*) | ***(*) | - | ***(*) | - | - | - | - | - |
| Aksfusarium | - | - | - | * | (*) | - | - | ** | ** | - | (*) | ** | **(*) | - | - | (*) | - | - |
| Sneskimmel | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | - | *** | - | - | - | - | - | - |
| Trådkølle | - | - | - | - | - | - | - | **** | - | - | - | **** | - | - | - | - | - | - |
| Normaldosering liter/kg pr. ha | 0,5 ⁴⁾ | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,25/1,9 ⁵⁾ | 0,8 | 1,6/2,0 ⁶⁾ | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

- = Ikke aktuelt, ikke godkendt eller ingen data
 * = Svag effekt (under 40%)
 ** = Nogen effekt (40-50%)

*** = Middel til god effekt (51-70%)
 **** = Meget god effekt (71-90%)

***** = Specialmiddel (91-100%)
 (*) = En halv stjerne

- Efter brug af Proline må der først sås eller plantes bladgrøntsager 5 måneder efter.
- På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, Hvedebladplet og Ramularia nu meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt.
- Mod bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
- Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
- 1,9 liter pr. ha i byg og 1,25 liter i andet korn.
- 1,6 liter pr. ha i byg og 2,0 liter pr. ha i hvede og rug.

Effekttabel ukrudt

● = 85-100% virkning
 ○ = 60-85% virkning
 □ = Under 60% - eller begrænset virkning

| Ukrudt | Majis | | | Ærter | | Raps | | Bederoer | | Kartofler | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------|---------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| | Callisto + Harmony | Callisto + Mais Ter | Maister | Basangran M75 + Slomp | Fighter 480 + Fenix | Galera | Matrignon | Betal Power + Gotlix SC | Betal Power + Gotlix SC + Safar | Matrignon | Boxer + Fenix + Titus | Fenix + Titus |
| Agerkål/-sempereklidke | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Agerstevmoder | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Agertisel | ● | ● | ● | ○ | ● | | | ● | ● | | ○ | |
| Bleg-/fersken plurt | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Buresnerre | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Førglemmelge | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Fuglegræs | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Gråbyrke (frespring) | ○ | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | | ○ | |
| Gul okseøjle | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Hanekro | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Håremac | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Hejreneb | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Hvidm. gåsefod (melde) | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Hyrdaske | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Kamille | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Kombloerst | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Kornvarme | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Krumhals | ● | ● | □ | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Liden nælde | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Løge-jordrog | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Maakebotte | ● | ● | ○ | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Rød tveland | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Skrappe | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Snerle pleurt | ● | ● | □ | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Sort natskygge | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Spergel | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Spildraps | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Storkeneb | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Svinemelde | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Svinemaak | ● | ● | ● | ○ | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Vejpleurt | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Æfenpris | ● | ● | □ | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Agerævehale | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Alm. rapgræs | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Bled hejre | ● | ● | ● | ● | ○ | | | ● | ● | | ● | |
| Erlårig rapgræs | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Flyvehavre | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Gold hejre | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Kvik | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Rajgræs | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |
| Vindkås | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● | |

Udyrkede arealer

| Brugsanvisning: Afgørelse(f) | Skadegørere | Løsning | Dosis pr. ha | Tidspunkt | Bemærkninger |
|---|--------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------|--|
| Fortove, Gårdspladser, Havegange, Indkørsler, Industrielle områder, Jernbaner, Parkeringsarealer, Terrasser, Vejle | Græsukruidt, tokrimbladet ukruidt | Pistol | 3, 11 | Forår på nyfremspriet ukruidt | På tugtig overflade tidligt forår på nyfremspriet ukruidt. Undgå at ramme planter, der ikke ønskes bekæmpet. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprølle anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtørvæske pr. 100 m ² . |
| Energipil, Juletræ, Skovkulturer | Græsukruidt, tokrimbladet ukruidt | Pistol | 3, 11 | Marts – juni | På tugtig jord marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 °C. Behandling kan ske med uskærmet sprøjtning indtil 10 dage før knopbygning. Efter knopbygning skal behandlingen ske med afskærmet sprøjtning. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprølle anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtørvæske pr. 100 m ² . |
| Ikke spiselige havebrugskulturer, Ikke spiselige planteskolekulturer, Læneegn | Græsukruidt, tokrimbladet ukruidt | Pistol | 3, 11 | Marts – juni | På tugtig jord fra marts til juni, når ukrudtet er i vækst og temperaturen er over 2-4 °C. Alle behandlinger skal ske med skærmet sprøjtning. Kulturer, herunder rotskud af planter, der ikke ønskes bekæmpet, må ikke rammes. Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af rygsprølle anvendes 31 ml Pistol i 2,5-10 liter sprøjtørvæske pr. 100 m ² . |

Ally® ST Express® ST

Fleksibel og sikker bekæmpelse i korn

- Ally® ST og Express® ST har effektiv virkning fra stadie 12 og ukrudtet er i vækst (> 2° C).
- Ally® ST må i byg og havre anvendes til stadie 30, hvede, rug og triticale til stadie 37.
- Ally® ST og Express® ST giver ingen restriktioner overfor afgrøderester, halm og husdyrgødning.

EXPRESS ST
MÅ ANVENDES I
6 UGER
FØR HØST

Se anbefalinger med blandingspartnere på
www.dupontagro.dk

ALLY® ST

EXPRESS® ST

DU PONT

The miracles of science™



PLANTEVÆRNS AFTALE 2011



Få sikkerhed for leverance af planteværn til foråret

Lav en planteværnsaftale med Brødr. Ewers om levering af planteværn

Aftalen omfatter:

- * Fragtfri levering af hovedordre
- * Suppleringsvarer kan leveres på varetur eller afhentes
- * Returret inden 30. juni 2011 uden prisreduktion
- * Konkurrencedygtige priser
- * Weekend vagt
- * Gratis telefonrådgivning



- fordi kvalitet gi'r resultater